

SIALANAR, ORAL OPLØSNING

HUSKEKORT TIL OMSORGSPERSONER

Huskekort til omsorgspersoner

Sialanar (glycopyrronium), oral opløsning – sådan håndterer du almindelige bivirkninger

De bivirkninger, der er forbundet med Sialanar (et antikolinergt lægemiddel), kan være dosisafhængige og vanskelige at vurdere hos et handicappet barn. Dit barns læge vil tale med dig om almindelige bivirkninger, der kan forekomme, og hvordan du håndterer dem. Det er vigtigt at sørge for, at der gives en nøjagtig dosis hver gang, for at forebygge de skadevirkninger af Sialanar, der ses ved fejldosering eller overdosering.

Vigtige oplysninger om, hvordan du skal give Sialanar

- Giv altid Sialanar nøjagtigt efter lægens anvisning. Du må ikke give en større dosis uden lægens tilladelse. Er du i tvivl, så spørg lægen.
- Giv Sialanar mindst én time før eller to timer efter måltider. Hvis barnets specifikke behov kræver, at medicinen gives sammen med mad, er det vigtigt at give Sialanar på det samme tidspunkt i forhold til fødeindtagelsen. Det må ikke gives sammen med fedtrige fødevarer.
- Du skal afmåle og kontrollere dosen af Sialanar med den medfølgende særlige målesprøjte (oral sprøjte). Dobbelttjek altid, at du har suget den korrekte dosis Sialanar op i sprøjten. Der findes en vejledning i brug af sprøjten i *indlægssedlen*.
- Doseringstabellen i slutningen af dette kort skal udfyldes af den ordinerende læge, når behandlingen påbegyndes, og ved hver dosisændring. Formålet med den er at minde omsorgspersonen om den korrekte dosis, der skal gives til barnet.

Sådan håndterer du vigtige bivirkninger

- Hvis en eller flere af følgende bivirkninger forekommer, skal du holde op med at give barnet medicinen og søge akut lægehjælp;
 - Besvær med at komme af med afføringen (forstoppelse)
 - Besvær med at tisse eller med at tømme blæren helt (urinretention)
 - Alvorlig lungeinfektion (pneumoni)
 - Allergisk reaktion (udslæt, kløe, rødt og hævet kløende udslæt (nældefeber), vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær, svimmelhed)
- Bivirkninger kan sommetider være vanskelige at opdage hos visse patienter med neurologiske problemer, fordi de har svært ved at udtrykke, hvordan de har det. Hvis du tror, at der er opstået en generende bivirkning efter en dosisøgning, skal du nedsætte dosis til den foregående dosis og kontakte barnets læge.
- Undgå at udsætte barnet for varmt eller meget varmt vejr for at undgå overophedning og muligheden for hedeslag. Spørg barnets læge til råds, når vejret er varmt, eller hvis barnet har feber, for at se om Sialanar-dosen skal mindskes.
- Da nedsat spyttproduktion kan øge risikoen for tandsygdomme, er det vigtigt, at den daglige tandhygiejne passes, og at barnet kommer regelmæssigt til tandlæge.
- Mål barnets puls med jævne mellemrum. Spørg barnets læge til råds, hvis hjertefrekvensen er meget langsom eller meget hurtig.
- Hold øje med eventuelle ændringer i barnets velbefindende eller adfærd, og snak med barnets læge om disse.

Yderligere oplysninger

- Søg akut lægehjælp, hvis barnet får for meget Sialanar, også selvom barnet ser ud til at have det godt.
- Fortæl barnets læge det, hvis barnet får eller eventuelt skal have anden medicin eller har fået det for nylig.
- Rådfør dig med barnets læge mindst hver 3. måned for at sikre dig, at Sialanar stadig er det rigtige for barnet.

Der findes flere oplysninger om at tage Sialanar i indlægssedlen, som du kan få hos dit barns læge.

Se nedenstående doseringstabel for at finde den korrekte dosis, du skal give dit barn.

Doseringstabel

Patientens navn: _____ Fødselsdato: _____

Lægens navn: _____

Lægens kontaktoplysninger: _____

Ordineret dosis (skal udfyldes af lægen):

Nr.	Dosis (ml)	Startdato (ddmmåå)	Slutdato (ddmmåå)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

For mere detaljerede oplysninger om Sialanar henvises til *indlægssedlen*.

For yderligere oplysninger eller forespørgsler om Sialanar e-mail: info@frostpharma.com

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Proveca Pharma Limited, Marine House, Clanwilliam Place, Dublin 2, Irland.

Dette huskekort blev senest ændret September 2019.